

<b>AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARÈS</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b>
	NÚM.VERSIÓN: 9
	FECHA: 02/05/2022

<b>PRODUCTO:</b>	<b>AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARÈS</b>
<b>Apariencia:</b>	Polvo fino amarillo
<b>Caducidad:</b>	3 años
<b>Comentarios Adicionales:</b>	

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	OBSERVACIONES
Azufre ( % (p/p) )	99,00+- 2,00	
Azufre insoluble en CS <sub>2</sub> ( % )	>= 15,00	
Cenizas ( % (p/p) )	<= 0,30	
Acidez ( % )	<= 1,00	
Contenido en SO <sub>2</sub> ( % )	<= 0,30	
Humedad ( % (p/p) )	<= 0,50	
Rechazo a tamiz 150 µm (100 ASTM) ( % )	<= 5,00	
Densidad aparente ( g/ml )	<= 0,80	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>
El azufre sublimado es un producto de azufre de alta pureza que presenta una elevada adherencia y eficacia a temperaturas bajas. La presencia de azufre polimérico lo dota de una mayor persistencia en su efecto fungicida y acaricida.

<b>INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO:</b>						
Aplicar en espolvoreo, especialmente en las zonas en que por las bajas temperaturas resulte conveniente reforzar la acción del azufre. No aplicar a temperaturas demasiado elevadas.						
CULTIVO *	AGENTE	DOSIS (kg/ha)	Nº APLIC.	INTERVALOS	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD
<b>Melón</b>	Oidio/ Oidiopsis/ Araña roja/ Ácaros	20-30	Máx. 3	Mín. 7	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.	NP

<b>Sandía</b>	Oidio/ Oidiopsis/ Araña roja/ Ácaros	20-30	Máx. 3	Mín. 7	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.	NP
<b>Tomate</b>	Oidio/ Oidiopsis/ Araña roja/ Ácaros	20-30	Máx. 3	Mín. 7	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.	NP
<b>Vid</b>	Oidio/ Araña roja/ Erinosis	20-30	Máx. 5	Mín. 10	En la etapa del cultivo comprendida desde el desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 10-19), sólo se podrá efectuar una aplicación de máximo 30 kg producto/ha. En caso de realizar 5 aplicaciones (desde la aparición del órgano floral, BBCH 19, hasta 5 días antes de cosechar) se harán con las siguientes dosis máximas: 1ª, 2ª aplicación: 30 kg producto/ha; 3ª aplicación: 25 kg producto/ha; 4ª 5ª aplicación: 20 kg producto/ha	NP

\*Antes del uso consultar el registro del país

### COMPATIBILIDAD

No aplicar aceites minerales durante 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

### ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en un lugar fresco, aireado y debidamente cerrado en su envase original para su mayor conservación. Además, se recomienda evitar la exposición del producto a temperaturas extremas.

Para mayor seguridad, mantener alejado de productos alimentarios y del alcance de los niños.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DURANTE SU MANIPULACIÓN

Manipular el producto en espacios abiertos y aireados. Evitar cualquier contacto físico con el producto. En caso contrario, limpiar la zona afectada con abundante agua.



**PRESENTACIÓN:**

10 kg, 25 kg

**TRANSPORTE:**

**Azufre y Fertilizantes Pellarès, SAU**  
Pol. Ind. de Constantí · Av. de Europa, 1-7  
43120 Constantí · Tel. 977 524 650  
afepasa@afepasa.com - www.afepasa.com

