Capacidad 1 l | 5 l | 20 l

# Sufrevit®

| | |
|---|---|
| Composición | Azufre 80% p/v (800 g/l) |
| Formulación | (SC) - Suspensión concentrada |
| Nº Registro | 16.419 |

## CARACTERÍSTICAS

SUFREVIT® es un fungicida-acaricida de contacto adecuado para combatir todas las formas de oídio. Posee un excelente efecto secundario sobre ácaros en general (arañas rojas y eriófidos).
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC: el azufre pertenece al grupo M02 (actividad multi-sitio) con baja probabilidad de resistencia.

## USO, DOSIS Y APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamiento al aire libre por pulverización con tractor y al aire libre e invernadero mediante pulverización manual (lanza/pistola) y mochila, según temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.plicar en pulverización normal, en cultivos al aire libre mediante tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola, según temperatura ambiental, cultivo, época de tratamiento, etc.

| Cultivo | Objetivo | Dosis | Nº aplicaciones (intervalos) | Vol. Caldo (l/ha) | Forma y época de aplicación (Condic. específico) | P.S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cítricos** (aire libre) | Araña roja común (*Tetranychus spp.*) Ácaro rojo de los cítricos (*Panonychus citri*) Ácaro oriental (*Eutetranychus orientalis*) | 0,25 – 0,3% | 1 – 3 (7 -10 días) | 1500-2500 | Aplicar el producto desde que se abren las primeras flores hasta que el fruto está maduro y apto para el consumo (BBCH 60-89) Dosis por aplicación: 3.75-7.5 l/ha | 1 día |
| **Frutales de hueso, frutales de pepita** (aire libre) | Araña roja común (*Tetranychus spp.*) Ácaros eriófidos (*Eriophyidae*) Oidios (*Erysiphaceae*) | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 (7 -15 días) | 700 - 1000 | Aplicar el producto desde marzo hasta principio de mayo, desde el comienzo del hinchado de las yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). Dosis por aplicación: 1.4-5 l/ha | |
| **Almendro** (aire libre) | | | | | | |
| **Vid** (aire libre) | Araña roja común (*Tetranychus spp.*) Ácaros eriófidos (*Eriophyidae*) Oidio de la vid (*Erysiphe necator*) | | Máx. 6 (7 -15 días) | 250-1000 | Aplicar el producto desde inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose hasta el principio de la maduración (BBCH 57-80). Dosis por aplicación: 0.5-5 l/ha | |

SIPCAM IBERIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vid**<br>(aire libre) | Araña roja común (*Tetranychus spp*)<br>Ácaros eriófidos (*Eriophyidae*)<br>Oidio de la vid (*Erysiphe necator*) | | Máx. 6<br>(7 -15 días) | 250-1000 | Aplicar el producto desde inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose hasta el principio de la maduración (BBCH 57-80).<br>Dosis por aplicación: 0,5-5 l/ha | |
| **Fresal**<br>(aire libre y en invernadero) | Oídios (*Erysiphaceae*)<br>Araña roja común (*Tetranychus spp*) | | Máx. 6<br>(7 -10 días) | 600-800 | Aplicar el producto desde que se alcance la 2ª cosecha con los frutos más coloreados (BBCH 89).<br>Dosis por aplicación 1,2-4 l/ha | |
| **Zanahoria**<br>(aire libre) | Ácaros<br>Oidio de la zanahoria (*Erysiphe heraclei*)<br>Oidio, oidiopsis (*Leveillula taurica*) | | *Máx. 4*<br>*(7 -10 días)* | 300 | Aplicar el producto desde que se alcance el tamaño típico (BBCH 49).<br>Dosis por aplicación: 0,6-1,5 l/ha | |
| **Solanáceas (excepto patata)**<br>(aire libre y en invernadero) | Araña roja común (*Tetranychus spp*)<br>Ácaros Oidios (*Erysiphaceae*)<br>Oidio, oidiopsis (*Leveillula taurica*) | | Máx. 6<br>(7 -10 días) | 400-1000 | Aplicar el producto desde la primera inflorescencia visible (BBCH 51).<br>Dosis por aplicación: 0,8-5 l/ha | |
| **Cucurbitáceas**<br>(aire libre y en invernadero) | Araña roja común (*Tetranychus spp*)<br>Ácaros<br>Oidios (*Erysiphaceae*)<br>Oidio, oidiopsis (*Leveillula taurica*) | | Máx. 6<br>(7 -10 días) | 400-1000 | Aplicar el producto desde la primera inflorescencia visible (BBCH 51).<br>Dosis por aplicación: 0,8-5 l/ha | |
| **Lechuga y similares**<br>(aire libre) | Oídios (*Erysiphaceae*) | | Máx. 4<br>(7 -10 días) | 300-500 | Aplicar el producto desde que se alcance el tamaño típico (BBCH 49).<br>Dosis por aplicación: 0,6-2,5 l/ha | |
| **Guisantes para grano y guisante verde**<br>(aire libre) | Oídios (*Erysiphaceae*)<br>Ácaros | 0,2 – 0,5% | Máx. 4<br>(7 -10 días) | 300-500 | Aplicar el producto desde que los primeros botones florales individuales, visibles fuera de las hojas, pero cerrados todavía (BBCH 55).<br>Dosis por aplicación: 0,6-2,5 l/ha | NP |
| **Cereales de invierno/primavera**<br>**Cereales de verano**<br>(aire libre) | Oidio de los cereales (*Blumeria graminis*) | | Máx. 2<br>(7 - 10 días) | 250-350 | Aplicar el producto desde el 4º nudo perceptible (BBCH 34).<br>Dosis por aplicación: 0,5-1,75 l/ha | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Olivo**<br>(aire libre) | Negrillas (*Capnodium spp.*)<br>Ácaros eriófidos (*Eriophyidae*)<br>Araña roja común<br>(*Tetranychus spp.*) | 1 | 600-800 | Aplicar el producto en primavera desde que los brotes alcanzan 10% de su tamaño final hasta la apertura de las primeras flores (BBCH 31-60).<br>Dosis por aplicación: 1.2-4 l/ha |
| **Lúpulo**<br>(aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*)<br>Ácaros | Ácaros<br>(7 - 10 días) | 1000 | Aplicar el producto desde BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).<br>Dosis por aplicación: 2-5 l/ha |
| **Borraja**<br>(aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*) | Máx. 4<br>(7-10 días) | 300-500 | Aplicar el producto desde que se alcance el tamaño típico (BBCH 49).<br>Dosis por aplicación: 0.6-2.5 l/ha |
| **Remolacha azucarera**<br>(aire libre) | Araña roja común<br>(*Tetranychus spp.*)<br>Oidios (*Erysiphaceae*) | Máx. 4<br>(7-10 días) | 250-500 | Aplicar el producto desde que las plantas se tocan en un 90% entre las hileras (BBCH 39).<br>Dosis por aplicación: 0.5-2.5 l/ha |
| **Arbustos y pequeños árboles ornamentales Palmáceas**<br>(aire libre)<br>**Coníferas y frondosas (exclusivamente para uso ornamental)**<br>(aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*)<br>Ácaros | Máx. 6<br>(7-10 días) | 400-1000 | Aplicar el producto en cualquier estado de desarrollo del cultivo.<br>Dosis por aplicación: 0.8-5 l/ha |
| Usos menores: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51.5 Reglamento (CE) 1107/2009) | | | | |
| **Avellano*, nogal*, pistachero*, castaño* y pacano, nuez de pecán***<br>(aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*)<br>Ácaros<br>Ácaros eriófidos (*Eriophyidae*)<br>Araña roja común<br>(*Tetranychus spp.*) | Máx. 6<br>(7-15 días) | 700-1000 | Aplicar el producto desde marzo hasta principio de mayo, desde el comienzo del hinchado de las yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69).<br>Dosis por aplicación: 1.4-5 l/ha |
| **Arándano, mirtilo***<br>(aire libre e invernadero) | Oidios (*Erysiphaceae*)<br>Ácaros | Máx. 6<br>(7-10 días) | 400-1000 | Aplicar el producto desde la primera inflorescencia visible (BBCH 51).<br>Dosis por aplicación: 0.8-5 l/ha |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate*, mango*, caqui* y granado* (aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*) Ácaros | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 (7-15 días) | 700-1000 | Aplicar el producto desde marzo hasta principio de mayo, desde el comienzo del hinchado de las yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). Dosis por aplicación: 1,4-5 l/ha | NP |
| Garbanzo*, haba para grano*, judía para grano*, lenteja*, judía verde* (para producción con y/o sin vaina), haba verde* (para producción con y/o sin vaina), lenteja verde* (para consumo sin vaina), garbanzo verde* (para producción con y/o sin vaina) (aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*) Ácaros | | Máx. 4 (7-10 días) | 300-500 | Aplicar el producto desde que los 1os primeros botones florales individuales, visibles fuera de las hojas, pero cerrados todavía (BBCH 55). Dosis por aplicación: 0,6-2,5 l/ha | |
| Apionabo*, rábano rusticano*, chirivía*, rábano*, salsifí*, colinabo*, nabo*, escorzonera*, pataca, aguaturma, tupinambo*, raíz de perejil*, batata, boniato*, ñame* y chufa* (aire libre) | Oidios (*Erysiphaceae*) Ácaros | | Máx. 4 (7-10 días) | 300 | Aplicar el producto desde que se alcance el tamaño típico (BBCH 49). Dosis por aplicación: 0,6-1,5 l/ha | |

- P.S. - Plazo de seguridad
- NP - No procede establecer ningún plazo de seguridad

*** La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.**

**Contra oídio de la vid:** Para un primer tratamiento, cuando la temperatura es baja, el producto se emplea a dosis de 200 a 250 cc por cada 100 litros de agua. Con el aumento gradual de la temperatura, según la época, reducir la dosis a un mínimo de 200 cc por cada 100 litros de agua.

**Para árboles frutales:** Aplicar de 400 a 500 cc por cada 100 litros de agua, antes de floración, siguiendo un tratamiento postfloral de 300 a 400 cc/hl. En los tratamientos sucesivos ir rebajando la dosis hasta un mínimo de 200 cc por cada 100 litros de agua.

El producto puede verterse directamente en el depósito de la cuba o depósito de pulverizar cuando esté lleno hasta la mitad con el agitador en marcha, llenándolo totalmente después.

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.